

Hyper-Osmolar Non-Ketotic Coma (HONK)

Diagnosis

هتشك في HONK لو لقيت

Signs of dehydration + RBG > 500 + No acetone in urine

ER management

Rapid IV infusion 0.9% محلول ملح (زجاجتين) لتر

ثم تحويل الحالة أو طلب نائب الباطنة

Hypoglycemia

Diagnosis (Whipple's Triad)

1. Symptoms of hypoglycemia

- Drowsiness , blurred vision
- Irritability & tremors
- Tachycardia & palpitation
- Sweating
- Hunger

داخ و عينه مزغللة

عصبية و رعشة

رفرفة و زيادة ضربات القلب

عرق شديد

لو فابق هيقولك انه دعان

2. Random Blood Sugar : < 60 mg/dl

3. Relief of symptoms after glucose administration

أخذت كام وحدة ؟ و أكلت بعد الأنسولين ولا لا ؟ لو مريض سكر هتسأل
من أشهر الأسباب في مريض السكر جرعة انسولين زائدة أو خد الحقنة و ما أكلش

ER management

❖ لو فابق : هياكل أي حاجة مسكرة (عسل أو مية بسكر) أو يشرب عصير

❖ لو مش فابق : 200 – 300 ml glucose or dextrose 10%

مع متابعة السكر حتى يتحسن المريض و يصل الجلوكوز إلى أكثر من 70 mg/dl

بعد استرداد الوعي و توقف المحلول : لازم ياخذ حاجة مسكرة أو عصير
لأن الجلوكوز بيحفز افراز الانسولين لو معملش كدة ممكن يدخل في النوبة تاني